

แนวทางการทิ้งขยะติดเชื้อ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ส่วนงานจัดให้มีจุดแยกทิ้ง ขยะติดเชื้ออย่างน้อย 1 จุด



น้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ หรือ
แอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70


ส่วนงานขนย้ายขยะติดเชื้อ

เมื่อส่วนงานจัดเก็บหรือรวบรวมขยะติดเชื้อที่ใส่ถุงแดง
เรียบร้อยแล้ว การเคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะ
ให้ส่วนงานขนย้ายขยะติดเชื้อไปไว้ที่อาคารพักขยะติดเชื้อ
บริเวณหลังที่จอดรถ(P5)เพื่อรอการจัดเก็บต่อไป



1

เป็นถึงสีแดงมีฝาปิดมิดชิดหรือถังขยะสีอื่นซึ่งต้อง
มีป้ายติดว่า "ขยะติดเชื้อ" อนุญาตให้ทิ้งเฉพาะ
หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK ถุงมือยาง เท่านั้น



2

ส่วนงานต้องมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดูแลเปลี่ยนถุงขยะติดเชื้อ

การเก็บขยะติดเชื้อจากถังเพื่อนำส่ง

1.เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน ใส่หน้ากากอนามัย สวม
ถุงมือยางและรองเท้าบูท ก่อนสัมผัสขยะติดเชื้อ

2.เจ้าหน้าที่ของส่วนงาน นำถุงขยะติดเชื้อออกจาก
ถังมิดปากถุงให้แน่นและทำการฆ่าเชื้อรอบถุงชั้นแรก
จากนั้นซ้อนถุงชั้นที่ 2 มิดปากถุงให้แน่นและทำการ
ฆ่าเชื้ออีกครั้ง

3



4

อาคารพักขยะติดเชื้อ บริเวณหลังที่จอดรถ(P5)

ส่วนงานสามารถเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อมาที่อาคาร
พักขยะติดเชื้อ บริเวณหลังที่จอดรถ(P5)ทุกวัน
พฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ทั้งนี้ ก่อนทำ
การขนย้ายจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม โทร 02-4414400 ต่อ 1212-13
เพื่อดำเนินการขึงน้ำหนักและจัดเตรียมสถานที่
ก่อนทุกครั้ง



มหาวิทยาลัยมหิดล มัญจาคีรี

ประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เรื่องแนวทางการทิ้งขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564



ประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง แนวทางการทิ้งขยะติดเชื้อภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้สามารถประกอบกิจกรรมด้านต่างๆ ได้ และเตรียมเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถจัดการขยะติดเชื้อ และทิ้งอย่างถูกวิธี อันได้แก่ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในการนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำแนวทางการทิ้งขยะติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ

1. ส่วนงานจะต้องจัดให้มีจุดแยกทิ้งขยะติดเชื้อ ประเภทหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) อย่างน้อยจำนวน 1 จุด เพื่อรองรับขยะติดเชื้อ เป็นถังสีแดงมีฝาปิดมิดชิดหรือถังขยะสีอื่น ซึ่งจะต้องมีป้ายติดว่า “ขยะติดเชื้อ” ทิ้งขยะในถุงพลาสติกสีแดง 2 ชั้น มีข้อความระบุ “ขยะติดเชื้อ” ให้ชัดเจน

2. ส่วนงานจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลเปลี่ยนถุงแดงหรือจัดเก็บขยะติดเชื้อจากถังขยะและฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 เมื่อส่วนงานตั้งถังรองรับขยะติดเชื้อแล้ว ให้ดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อโรค จากนั้นใส่หรือสวมถุงแดงเพื่อรองรับขยะติดเชื้อ แล้วปิดฝาลังให้สนิท

2.2 เมื่อส่วนงานจัดเก็บขยะติดเชื้อจากถัง ในถุงชั้นแรกให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นจากนั้นฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อ จากนั้นใส่ในถุงชั้นที่ 2 มัดปากถุงให้แน่นแล้วฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

3. เมื่อส่วนงานจัดเก็บหรือรวบรวมขยะติดเชื้อที่ใส่ถุงแดงเรียบร้อยแล้ว การเคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะ ให้ส่วนงานขนย้ายขยะติดเชื้อไปไว้ที่อาคารพักขยะติดเชื้อ บริเวณหลังที่จอดรถชั่วคราว (P5) เพื่อรอการจัดเก็บต่อไป

4. ส่วนงานสามารถเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อมาที่อาคารพักขยะติดเชื้อ บริเวณหลังที่จอดรถชั่วคราว (P5) ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ทั้งนี้ ก่อนทำการขนย้ายจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-4414400 ต่อ 1212-13 เพื่อดำเนินการขั้่นนำหนักและจัดเตรียมสถานที่ก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

๒๑

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต)

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. ส่วนงานจะต้องจัดให้มีจุดแยกทิ้งขยะติดเชื้อ ประเภทหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และชุดตรวจ

Antigen Test Kit (ATK) อย่างน้อยจำนวน 1 จุด เพื่อรองรับขยะติดเชื้อ เป็นถังสีแดงมีฝาปิดมิดชิดหรือถังขยะสีอื่น ซึ่งจะต้องมีป้ายติดว่า “ขยะติดเชื้อ” ทิ้งขยะในถุงพลาสติกสีแดง 2 ชั้น มีข้อความระบุ “ขยะติดเชื้อ” ให้ชัดเจน

2. ส่วนงานจะต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลเปลี่ยนถุงแดงหรือจัดเก็บขยะติดเชื้อจากถังขยะและฆ่าเชื้อโรคด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟอกขาวผสมน้ำ หรือแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 70 โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้

2.1 เมื่อส่วนงานตั้งถังรองรับขยะติดเชื้อแล้ว ให้ดำเนินการฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อโรค จากนั้นใส่หรือสวมถุงแดงเพื่อรองรับขยะติดเชื้อ แล้วปิดฝาลังให้สนิท

2.2 เมื่อส่วนงานจัดเก็บขยะติดเชื้อจากถัง ในถุงชั้นแรกให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นจากนั้นฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อ จากนั้นใส่ในถุงชั้นที่ 2 มัดปากถุงให้แน่นแล้วฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

3. เมื่อส่วนงานจัดเก็บหรือรวบรวมขยะติดเชื้อที่ใส่ถุงแดงเรียบร้อยแล้ว การเคลื่อนย้ายขยะไปยังจุดรับทิ้งขยะ ให้ส่วนงานขนย้ายขยะติดเชื้อไปไว้ที่อาคารพักขยะติดเชื้อ บริเวณหลังที่จอดรถชั่วคราว (P5) เพื่อรอการจัดเก็บต่อไป

4. ส่วนงานสามารถเคลื่อนย้ายขยะติดเชื้อมาที่อาคารพักขยะติดเชื้อ บริเวณหลังที่จอดรถชั่วคราว (P5) ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. ทั้งนี้ ก่อนทำการขนย้ายจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-4414400 ต่อ 1212-13 เพื่อดำเนินการขั้่นนำหนักและจัดเตรียมสถานที่ก่อนทุกครั้ง



มหาวิทยาลัยมหิดล
นิพนธ์แห่งใหม่

วัสดุอุปกรณ์ที่ส่วนงานจะต้อง
จัดเตรียมในการจัดเก็บขยะติดเชื้อ

1. ถังขยะ และติดป้าย “ขยะติดเชื้อ”



2. ถุงแดง ตามขนาดของถังขยะ



3. น้ำยาฆ่าเชื้อ



4. หน้ากากอนามัย



5. ถุงมือยาง



6. รองเท้าบูท





มหาวิทยาลัยมหิดล
นิเทศศาสตร์

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนนำขยะติดเชื้อมาทิ้ง ที่อาคารพักขยะติดเชื้อ (ลานจอดรถ P5)

1. เจ้าหน้าที่ของคณะ/สถาบัน
สวมใส่หน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง
และรองเท้ายาง ก่อนสัมผัสขยะติดเชื้อ



2. เจ้าหน้าที่ของคณะ/สถาบัน นำถุงขยะติดเชื้อออกจากถัง
มัดปากถุงให้แน่นและทำการฆ่าเชื้อรอบถุงชั้นแรก
จากนั้นซ้อนถุงชั้นที่ 2 มัดปากถุงให้แน่นและทำการฆ่าเชื้ออีกครั้ง





มหาวิทยาลัยมหิดล นิเทศศาสตร์

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนนำขยะติดเชื้อมาทิ้ง ที่อาคารพักขยะติดเชื้อ (ลานจอดรถ P5)

3.เจ้าหน้าที่ของคณะ/สถาบัน นำขยะติดเชื้อ มาที่บริเวณอาคารพักขยะติดเชื้อ



ไทยรัฐ
สู้โควิด

การจัดการขยะติดเชื้อ

ที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)
และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)

ขยะติดเชื้อที่เกิดจากการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation)
ได้แก่ ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ภาชนะใส่อาหารพร้อมบริโภค (แบบใช้ครั้งเดียว) และชุดตรวจ Antigen Test Kit เป็นต้น ถือเป็นขยะที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องแยกจัดการจากขยะทั่วไป

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนที่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ

- 1** เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะ (ถุงแดง) 2 ชั้น

1. ถุงชั้นแรก ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีกพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว (เช่น ไฮเตอร์)

2. ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีกพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง

3. นำไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะ
- 2** ประสานหน่วยงาน อปท. หรือ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อเก็บ ขน และนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง
- 3** ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรณีในพื้นที่หรือชุมชนที่ไม่มีระบบการเก็บขยะติดเชื้อ

- 1** เก็บรวบรวมขยะติดเชื้อเป็นประจำทุกวัน ใส่ถุงขยะทั่วไป 2 ชั้น

1. ถุงชั้นแรกกับบรรจุขยะติดเชื้อ ให้ราดด้วยสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวลงในถุง เพื่อทำลายเชื้อ

2. มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น แล้วฉีกพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง

3. ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น และฉีกพ่นบริเวณปากถุงด้วยสารฆ่าเชื้ออีกครั้ง
- 2** ขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้ว ให้ประสานและนำส่ง อปท. ในพื้นที่ เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป
- 3** ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

สแกนคิวอาร์โค้ด
รับชมความรู้เรื่อง COVID-19

เผยแพร่ : 14 กรกฎาคม 2564



มหาวิทยาลัยมหิดล นิปูนาหอแพ่ง

ภาพอาคารพักขยะติดเชื้อ บริเวณลานจอดรถชั่วคราว 5





1. มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ 2 คน



2. มีการฉีดยาฆ่าเชื้อถุงขยะก่อน 1 คน



3. มีผู้จดน้ำหนักของขยะติดเชื้อ 1 คน





มหาวิทยาลัยมหิดล
นิปูนาของแผ่นดิน

ขั้นตอนการนำส่งขยะติดเชื้อ





4. ดำเนินการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้ว ก็ยกเข้าเก็บภายในอาคาร





5. เมื่อดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อเสร็จ ก่อนออกจากสถานที่จะต้องฉีดพ่นล้างมือให้เรียบร้อย

