

ประเด็นทางก្នុហ៍មាយលេស់គម

ពីរក្រឹងក្រាម

គណនី
នរោត្តមន្ត្រី
នគរបាល

វាគទាហេរិក

ជាតិ

សាស្ត្រ

ข้อดี

- มูลค่าทางเศรษฐกิจ
- การจ้างงาน
- การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- การพัฒนาอยา และอาหาร
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การท่องเที่ยว
- ภาษีเข้ารัฐมากขึ้น

ข้อควรระวัง: เพิ่มการสเปกคุณภาพและสารเสพในวัยรุ่น

- เพิ่มการสเปกคุณภาพและสารเสพในวัยรุ่น
- การสเปกคุณภาพส่งผลต่อสมองหดหู่
 - สมองของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่เต็มที่ การสเปกคุณภาพอาจส่งผลให้ความจำ สมาร์ต แก้ปัญหาพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆ
 - ทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อและความเคลื่อนไหวเสื่อมลง
- ความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ข้อควรระวัง: กัญชาเป็นสารเสพติด

- เมื่อหดเหลาสามารถเกิดอาการถอนยาได้อย่างชัดเจน ได้แก่
 - อาการนอนไม่หลับ
 - อารมณ์ซึมเศร้า
 - กระวนกระวาย
 - คลื่นไส้ ปวดท้อง
- การรักษาภาวะเสพติดกัญชา มีความยาก พอๆ กับการรักษาภาวะติดยาบ้า ยาไอซ์ โคลน และสุรา
- เด็กวัยรุ่นมีความเสี่ยงในการเสพติดมากกว่าผู้ใหญ่

ข้อควรระวัง: ผลโดยตรงของกัญชาต่อสุขภาพ

- ภาวะพิษจากกัญชาสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือ เด็กและคนชรา
- เด็กอาจเกิดภาวะพิษจากการกินโดยอุบัติเหตุหรือเกินขนาด
- คนชรา
 - อาจมีแนวโน้มการใช้มากขึ้นเพื่อรักษาอาการต่างๆ เช่น นอนไม่หลับ เป็นอาหาร อาการปวด
 - อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะที่เกิดบ่อยอยู่แล้วอย่างรุนแรง เช่น พลัดตกหล่ม หัวใจเต้นผิดจังหวะ และ อันตรกิริยาภัย
- ผลกระทบในผู้ป่วยโรคจิตเวชซัดเจนมาก เพราะสามารถกระตุนให้เกิด
 - ภาวะจิตเภทได้ คือมีอาการรุนแรง หวาดระแวง ลั卜สน เอกอะໄวยวาย
 - ภาวะซึมเศร้า
- ความผิดปกติในหญิงตั้งครรภ์ที่ใช้กัญชา ภาวะเด็กแรกเกิดมีน้ำหนักน้อย

ข้อควรระวัง: การควบคุมมาตรฐาน

- การควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชา
 - ส่วนประกอบ
 - บรรจุภัณฑ์
 - การปนเปื้อน

ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน และการทำงาน

- เพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนน และการทำงาน
- กัญชาทางการรับประทานออกฤทธิ์ช้าและออกฤทธิ์นาน
- มีหลักฐานชัดเจนว่า
 - อุบัติเหตุรายนั้นดพิมพ์ขึ้นในคนที่มีประวัติใช้กัญชาหรือตรวจพบกัญชา
 - คนงาน ที่ตรวจพบกัญชาในร่างกายมีโอกาสเกิด อุบัติเหตุ ทำให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตและสูญเสียในสถานที่ทำงาน มากกว่าคนที่ไม่มีกัญชาในร่างกาย

ขอบเขตของผลกระทบ

- ความเสียหายไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้สารกัญชา แต่รวมไปถึงคนอื่นๆ ในชุมชนและสังคม
- รายได้ที่ได้จากการกัญชาอาจไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายจากการเสียหาย การบาดเจ็บ การรักษาพยาบาล ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ สุรา และ บุหรี่
- การสูบกัญชามากขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อผลทางสุขภาพจากการสูบ ต่อ ผู้สูบและบุคคลอื่นๆ เหมือนโรคจากการสูบ บุหรี่

ข้อปรึกษาหารือ

ปัจจัยและบุคลากรเหล่านี้มีความพร้อมหรือไม่

- กฎหมายและข้อบังคับ
 - การบังคับใช้กฎหมาย
 - การตรวจเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 - บุคลากรทางกฎหมาย
 - การตรวจเคราะห์เมื่อมีอุบัติเหตุและการเปลี่ยนแปลง
 - บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
 - บุคลากรทางอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
 - ประชาชน

ฝากถึงประชาชน

- อย่าลองเสพ
- อย่ารับประทานอาหารที่ไม่แน่ใจว่ามีปริมาณสาร **THC** อญุ่มakanห้อยเท่าไร
- อย่าใช้กัญชาในรูปแบบใดๆ ถ้ากินยาอื่นๆอยู่ โดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ขอบคุณครับ